

Профилактика описторхоза

В прошлом году описторхозом заболели 1039 жителей края.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения вырос на 30,8 % по сравнению с 2020 годом, но остается ниже среднеевропейского уровня почти на 19,0%.

Красноярский край - территория с высокими уровнями заболеваемости природно-очаговыми биогельминтозами, из которых описторхоз остается актуальной и социально значимой проблемой на эндемичных территориях края.

Природные очаги описторхоза связаны с р.Чулым и ее притоками, входящими в Обь-Иртышский водный бассейн: Тюхтетский район, Бирилюсский район, г. Ачинск, Ачинский район, г. Боготол, Боготольский район.

Заражение населения описторхозом происходит при употреблении в пищу малосоленой рыбы карповых пород: плотвы, сороги, леща, язя, ельца, линя.

Описторхоз, возбудителем которого является кошачий или сибирский сосальщик, протекает с поражением печени и желчного пузыря.

Рекомендации по профилактике:

Употреблять в пищу только хорошо проваренную и прожаренную, тщательно просоленную рыбу.

Промораживать рыбу в течение 3-4 недель.

Необходимо помнить, что нельзя покупать рыбу у частных лиц и в местах несанкционированной торговли. Приобретать рыбу и рыбную продукцию нужно в санкционированных торговых точках при наличии документов, удостоверяющих проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, сертификатов пищевого сырья и пищевых продуктов.

Для предотвращения дальнейшего распространения паразитов не следует сбрасывать в водоёмы и на мусорные свалки отходы переработки рыбной продукции, а также скармливать животным без предварительного обеззараживания.³⁹